


É muito importante que o ACS saiba quais são as vacinas disponíveis no SUS para os homens adultos.



CALENDÁRIO DE VACINAÇÃO DO ADULTO (SEM COMPROVAÇÃO DE VACINAÇÃO ANTERIOR OU QUE NUNCA FORAM VACINADOS, SEGUIR O ESQUEMA ABAIXO)

IDADE	VACINAS	DOSES	DOENÇAS EVITÁVEIS
A partir de 20 anos.	dT (Dupla tipo adulto) (1) Febre amarela (2) SCR (Tríplice viral) (3) Hepatite B (4)	1ª dose dose inicial dose única 1ª dose	Contra Difteria e Tétano Contra Febre Amarela Contra Sarampo, Caxumba e Rubéola Hepatite B
1 mês após a 1ª dose	Hepatite B	2ª dose	Hepatite B
2 meses após a 1ª dose	dT (Dupla tipo adulto)	2ª dose	Contra Difteria e Tétano
4 meses após a 1ª dose	dT (Dupla tipo adulto)	3ª dose	Contra Difteria e Tétano
6 meses após a 1ª dose	Hepatite B	3ª dose	Hepatite B
a cada 10 anos, por toda a vida	dT (Dupla tipo adulto)	Reforço	Contra Difteria e Tétano
10 anos depois da primeira dose	Febre amarela	Reforço	Contra Febre Amarela

(1) A vacina Dupla tipo adulto – dT (Difteria e Tétano) também deve ser administrada a partir dos 20 (vinte) anos. Os homens que não tiverem comprovação de vacinação anterior devem seguir o esquema acima. Apresentando documentação com esquema incompleto, completar o esquema já iniciado. O intervalo mínimo entre as doses é de 30 dias.

(2) A vacina contra Febre Amarela deve ser administrada em adulto que resida ou que for viajar para área endêmica (estados: AP, TO, MA, MT, MS, RO, AC, RR, AM, PA, GO e DF), área de transição (alguns municípios dos estados: PI, BA, MG, SP, PR, SC e RS) e área de risco potencial (alguns municípios dos estados BA, ES e MG). Em viagem para essas áreas, vacinar 10 (dez) dias antes da viagem. Se comprovar duas doses da vacina, considerar vacinado e não administrar nenhuma dose, caso comprove uma dose, o reforço deve ser realizado 10 anos após a primeira, se não comprovar nenhuma dose ou se relatar não ter sido vacinado, seguir o esquema acima.

(3) A vacina tríplice viral - SCR (Sarampo, Caxumba e Rubéola) deve ser administrada em homens até 49 (quarenta e nove) anos que não tiverem comprovação da vacina anterior.

(4) A vacina contra Hepatite B deve ser administrada em homens até 49 (quarenta e nove) anos que não tiverem comprovação da vacina anterior. Apresentando documentação com esquema incompleto completar o esquema já iniciado.

VAMOS REFLETIR!



Discuta com a sua equipe a possibilidade de realizar rodas de conversas com os futuros papais e mães em horários alternativos e, assim, trabalhar temas que possam envolver o casal em todos os momentos da gravidez, do parto e do pós-parto.