

Recomendações para imunizações em adolescentes

Na adolescência, são importantes outras vacinas como a da hepatite B.

Se você está com sua vacinação em dia, ótimo! Se não, procure logo o serviço de saúde para atualizá-la.

Veja, no quadro abaixo, as vacinas que devem ser tomadas:

Idade	Vacina
11 a 19 anos (primeira visita) (1ª)	contra hepatite B, contra difteria e tétano - dt (2ª) contra febre amarela (3ª), contra sarampo, caxumba e rubéola - SCR (4ª)
1 mes após a 1ª dose hep B	contra hepatite B
6 meses após a 1ª dose hep B	contra hepatite B
2 meses após a 1ª dose dt	contra difteria e tétano - dt (2ª)
4 meses após a 1ª dose dt	contra difteria e tétano - dt
A cada 10 anos, por toda a vida	contra febre amarela contra difteria e tétano - dt (5ª)



- 1º. Se você não tiver comprovação de vacina anterior, precisa seguir este esquema. Caso sua documentação esteja com esquema incompleto, precisa completá-lo.
- 2º. Se você já recebeu anteriormente três ou mais doses das vacinas DTP, DT ou dT, então deve receber uma dose de reforço. As vacinas de reforço são necessárias a cada dez anos. No caso de ferimentos graves, antecipar a dose de reforço para cinco anos após a última dose da vacina contra tétano. O intervalo mínimo entre as doses é de 30 dias.
- 3º. Adolescente que resida ou que irá viajar para área endêmica (estados: AP, TO, MA, MT, MS, RO, AC, RR, AM, PA, GO, e DF), área de transição (alguns municípios dos estados: PI, BA, MG, SP, PR, SC e RS) e área de risco potencial (alguns municípios dos estados: BA, ES e MG), vacinar dez dias antes da viagem.
- 4º. Você que é adolescente e tem duas doses da vacina Tríplice Viral (SCR), comprovadas no cartão de vacinação, não precisa receber essa dose, combinado?

